



Cyto-Red HA™

ΕΚ ΛΙΠΑΣΜΑ- λίπασμα ΝΚ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υγρό λίπασμα Καλίου (Κ) και Αζώτου (Ν) για χορήγηση αυτών των θρεπτικών στοιχείων στα καλλιεργούμενα φυτά με διαφυλλικό ψεκάσμο, ώστε να ευνοείται η ωρίμανση και ιδιαίτερα ο καλός χρωματισμός των καρπών.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάλιο υδατοδιαλυτό (K ₂ O)	15,0 %
Ουρικό άζωτο υδατοδιαλυτό (N)	3,0 %

pH: 7-8

Παράγεται από:

cytozyme

Cytozyme Laboratories, Inc.
2700 South 600 West

South Salt Lake City, UT 84115, USA

Καθαρό περιεχόμενο 5 λιτ, / 6,4 κιλά



ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ & ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκάσμο. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται οι ψεκάσμοι να γίνονται αργά στο δειλινό ή πολύ νωρίς το πρωί.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ/ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:

Ροδακινιές, Νεκταρινιές: Εφαρμόστε 5 λιτ./ 10 στρ. 14-21 ημέρες πριν από τη προβλεπόμενη ημέρα συγκομιδής και επαναλάβετε μέσα σε 48 ώρες μετά το πρώτο «χέρι» συγκομιδής.

Κερασιές: Εφαρμόστε 5 λιτ./ 10 στρ. 14 ημέρες πριν από τη προβλεπόμενη ημέρα συγκομιδής.

Αμπέλι (έγχρωμες ποικιλίες): Εφαρμόστε 5 λιτ./ 10 στρ. στην έναρξη αλλαγής χρώματος των ραγών και επαναλάβετε μέσα σε 48 ώρες μετά το πρώτο «χέρι» συγκομιδής.

Κόκκινες πιπεριές: Εφαρμόστε 5 λιτ./ 10 στρ. 14 ημέρες πριν από τη προβλεπόμενη ημέρα συγκομιδής και επαναλάβετε μέσα σε 48 ώρες μετά το πρώτο «χέρι» συγκομιδής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ το σκεύασμα πριν τη χρήση. Διαλύστε σε νερό αφού έχετε γεμίσει το δοχείο κατά το 1/3 και συμπληρώστε με νερό με συνεχή ανάδευση ώστε να έχουμε ομοιογενές διάλυμα. Για διαφυλλικό ψεκάσμο κάλυψη από εδάφους αναμίξετε 1 μέρος διαλύματος Cyto-Red HA με 100 έως 200 μέρη νερό. Για πολύ καλή συνδυαστικότητα με άλλα αγροχημικά και καλή απορρόφηση προτείνεται να ρυθμίστε το pH του διαλύματος ψεκάσμου μεταξύ των τιμών 5,5 και 6,5.

Συνδυάστε-αναμίξετε το Cyto-Red HA με άλλα αγροχημικά αφού πρώτα αυτά έχουν προδιαλυθεί. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία αγροχημικών, κάνετε προηγουμένως δοκιμή σε μικρή κλίμακα για έλεγχο της καλής και ασφαλούς συνδυαστικότητας με αυτά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 1°C έως 42°C, στις κλειστές συσκευασίες του και σε κλειστή αποθήκη, αποφεύγοντας το απευθείας ηλιακό φως. Μην αποθηκεύετε διαλυμένο προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη την ετικέτα και χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της. Μη κάνετε υπέρβαση προτεινόμενης δόσης και αριθμού εφαρμογών για αποφυγή φυτοτοξικότητας ή ανεπιθύμητων επιπτώσεων. Χρησιμοποιείστε το στα πλαίσια κανονικού προγράμματος θρέψης κάθε καλλιέργειας. Αν οι όροι χρήσης και της περιορισμένης εγγύησης δεν είναι αποδεκτοί από εσάς, επιστρέψετε αμέσως το σκεύασμα στην όχι ανοιγμένη συσκευασία του εκεί από όπου το αποκτήσατε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Cytozyme Laboratories, Inc. εγγυάται ότι το προϊόν αυτό συνάδει με τη περιγραφή της ετικέτας και με τις προδιαγραφές της βιομηχανίας. Οι συνθήκες και οι μέθοδοι χειρισμού του προϊόντος είναι έξω από τον έλεγχο της Cytozyme Laboratories, Inc. Επομένως, αυτή η εγγύηση εκτείνεται μόνο έως τη ταυτότητα και τη σύνθεση του κατά τη στιγμή της παράδοσης του. Η Cytozyme Laboratories, Inc. αποποιείται κάθε ευθύνης για προβλήματα που σχετίζονται με λανθασμένη χρήση ή χειρισμό αυτού του προϊόντος. (Αυτή η Περιορισμένη Ευθύνη δεν έχει νόημα όπου υπάρχει νομική απαγόρευση-παράβαση)

P102 Μακριά από παιδιά.

P270 Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.