MIKROVIT BOR – ZIN® TURBO

Κρυσταλλικό, υδατοδιαλυτό λίπασμα για διαφυλλική εφαρμογή σε φυτά που είναι ευαίσθητα στην ανεπάρκεια βόριου και ψευδαργύρου, ειδικά των οπωροφόρων δένδρων και των φυτών σαρκωδών καρπών πριν από τον χειμερινό λήθαργο ή στις αρχές της άνοιξης.

- ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ
- ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
- ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΑΡΚΩΔΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (Ε.2.4.1) Μείγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων: βόριο (Β) και ψευδάργυρος (Zn) (θειικός) - μίγμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ σε:	σε:	
	% (β/β)	g/kg
Βόριο (Β) διαλυτό στο νερό	**11,0**	110
ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό	**5,0**	50
Όλα τα συστατικά είναι υδατοδιαλυτά		

Εφαρμογή Το MIKROVIT BOR-ZIN TURBO είναι ένα κρυσταλλικό, υδατοδιαλυτό λίπασμα, το οποίο παρέχει βόριο και ψευδάργυρο στα φυτά που έχουν αυξημένες και ταυτόχρονες ανάγκες για αυτά τα μικροστοιχεία. Χάρη στην τεχνολογία INT (Innovative Nutrient Transfer) τα θρεπτικά συστατικά εισέρχονται γρήγορα στους ιστούς και μετακινούνται στο φυτό.

Το MIKROVIT BOR-ZIN TURBO έχει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων.

- Όταν εφαρμόζεται το φθινόπωρο πριν τον χειμερινό λήθαργο παρέχει στα φυτά βόριο και ψευδάργυρο σε προσλήψιμες από τα φύλλα μορφές που συσσωρεύονται στα ξυλώδη μέρη του φυτού και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την έναρξη της βλάστησης την άνοιξη.
- Όταν χρησιμοποιείται στην αρχή της άνοιξης παρέχει στα φυτά βόριο και ψευδάργυρο, σε μια περίοδο που τα φυτά αρχίζουν να σχηματίζουν φύλλα ή ο αριθμός τους είναι ακόμη σχετικά μικρός (BBCH 10-56).

Το MIKROVIT BOR-ZIN TURBO αποτελεί επίσης μια αποτελεσματική πηγή βορίου και ψευδαργύρου για άλλα φυτά που έχουν αυξημένες ανάγκες για αυτά τα μικροστοιχεία (π.χ. το καλαμπόκι, η πατάτα ή ο λυκίσκος) - συνιστάται κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένων, ταυτόχρονων αναγκών των φυτών για τα μικροστοιχεία αυτά.

Οδηγίες εφαρμογής Το MIKROVIT BOR-ZIN TURBO χρησιμοποιείται διαφυλλικά με τη μορφή υδατικού διαλύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα προϊόντα εφόσον ελεγχθεί η δυνατότητα ανάμιξης. Η συγκέντρωση του διαλύματος και η ποσότητα του υγρού προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των διαφόρων ειδών φυτών και τις τεχνικές ψεκασμού. Κατά την εφαρμογή αποφύγετε την έντονη ηλιοφάνεια, τις υψηλές θερμοκρασίες και τον άνεμο που παρασύρει τα σταγονίδια.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση δικαιολογημένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.

Παρασκευή διαλύματος: Προσθέστε το MIKROVIT BOR-ZIN TURBO σε ένα βυτίο γεμάτο κατά το ½–⅔ με νερό με την ανάδευση σε λειτουργία. Προσθέστε με παρόμοιο τρόπο άλλα επιτρεπόμενα και συνιστώμενα συστατικά του διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους. Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι το επιθυμητό σημείο. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του. Για να διαλυθεί καλύτερα πριν το προσθέσετε στη δεξαμενή ψεκασμού, συνιστάται να προδιαλύσετε νωρίτερα το λίπασμα MIKROVIT BOR-ZIN TURBO σε νερό με θερμοκρασία δωματίου και αναλογία 1 kg λιπάσματος ανά 4 λίτρα νερού.

INTERMAG

Παραγώγος: INTERMAG sp. z o.o.
Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Πολωνία
Τηλ: +48 32 64 55 900
www.intermag.eu

Καθαρή μάζα επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας/ Ημερομηνία παραγωγής στη συσκευασία
Ημερομηνία λήξης: 5 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής

Δόσεις και χρόνος/ στάδια εφαρμογής για επιλεγμένες καλλιέργειες
(◆ **βέλτιστη χρονική στιγμή** ◇ **χρονική στιγμή προαιρετικής/επικουρικής εφαρμογής)**
Οι προτεινόμενες συστάσεις είναι γενικής φύσεως. Μπορούν να τροποποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των φυτών και τις συνθήκες καλλιέργειας.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ Δόση ανά εφαρμογή λιπάσματος 0,35 kg/στρέμμα. Αριθμός επεμβάσεων 1–5.
Μετά τη συγκομιδή: ◆ 1–2 επεμβάσεις από την πρώτη εβδομάδα μετά τη συγκομιδή, κάθε 10–14 ημέρες πριν από την φυσική πτώση των φύλλων, ◇ μία επιπλέον επέμβαση στην αρχή της πτώσης των φύλλων (5-10% πτώσης φύλλων) μαζί με ένα διάλυμα ουρίας περιεκτικότητας 5% ή/και άλλων παρασκευασμάτων που επιταχύνουν την αποσύνθεση των φύλλων.
Άνοιξη: ◇ έκπτυξη οφθαλμών, ◇ αυτιά ποντικιού – πράσινη κορυφή.

Κερασιά, βισινιά. Δόση ανά εφαρμογή 0,35 kg/στρέμμα. Αριθμός επεμβάσεων 2–6.
Μετά τη συγκομιδή: ◆ 2–3 επεμβάσεις κάθε 10–14 ημέρες πριν από τη φυσική πτώση των φύλλων, ◇ μια επιπλέον επέμβαση στην αρχή της πτώσης των φύλλων (5-10% πτώσης φύλλων) μαζί με ένα διάλυμα ουρίας περιεκτικότητας 5% ή/και άλλων παρασκευασμάτων που επιταχύνουν την αποσύνθεση των φύλλων.
Άνοιξη: ◇ έκπτυξη οφθαλμών, ◇ πράσινη κορυφή.

Ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά. Δόση ανά εφαρμογή 0,35 kg/στρέμμα. Αριθμός επεμβάσεων 2–6.
Μετά τη συγκομιδή: ◆ 2–3 επεμβάσεις κάθε 10–14 ημέρες πριν από τη φυσική πτώση των φύλλων, ◇ μια επιπλέον επέμβαση στην αρχή της πτώσης των φύλλων (5–10% πτώσης φύλλων) μαζί με ένα διάλυμα ουρίας περιεκτικότητας 5% ή/και άλλων παρασκευασμάτων που επιταχύνουν την αποσύνθεση των φύλλων.
Άνοιξη: ◇ έκπτυξη οφθαλμών, ◇ ροζ/λευκή κορυφή.

Φραγκοστάφυλα, σμέουρα, μύρτιλλα. Δόση ανά εφαρμογή 0,35 kg/στρέμμα. Αριθμός επεμβασεων 1–4.
Μετά τη συγκομιδή: ◆ 1–2 επεμβάσεις κάθε 10–14 ημέρες πριν από τη φυσική πτώση των φύλλων, ◇ μια επιπλέον επέμβαση στην αρχή της πτώσης των φύλλων (5–10% πτώσης φύλλων) μαζί με ένα διάλυμα ουρίας περιεκτικότητας 5%ή/και άλλων παρασκευασμάτων που επιταχύνουν την αποσύνθεση των φύλλων.
Άνοιξη: ◇ μία επέμβαση στην αρχή της έκπτυξης οφθαλμών μέχρι να ξεδιπλωθούν εντελώς τα πρώτα φύλλα

Φράουλες Δόση ανά εφαρμογή 0,35 kg/στρέμμα. Αριθμός επεμβάσεων 1–3.
Μετά τη συγκομιδή: ◆ 1–2 επεμβάσεις κάθε 10–14 ημέρες πριν από τη φυσική πτώση των φύλλων.
Άνοιξη: ◇ μία επέμβαση στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης (έχουν ξεδιπλωθεί 3–7 φύλλα).

Καλαμπόκι. Δόση ανά εφαρμογή 2 kg/στρέμμα. Αριθμός επεμβάσεων 3: ◆ στάδιο 2–6 φύλλων, ◆ ανάπτυξη φύλλων – αρχή ανάπτυξης βλαστού, ◆ έναρξη ανάπτυξης φόβης.

Πατάτα. Δόση ανά εφαρμογή 2 kg/στρέμμα. Αριθμός επεμβάσεων 3: ◆ Ανάπτυξη φύλλων – έναρξη πλάγιας εκβλάστησης, ◆ έναρξη σχηματισμού κονδύλων, ◆ οι κόνδυλοι έχουν αποκτήσει το 30-40% του τελικού μεγέθους,

Λυκίσκος Δόση ανά εφαρμογή 1-2 kg//στρέμμα. Αριθμός επεμβάσεων 3: ◆ οι βλαστοί έχουν φτάσει στο 30–50% του ύψους των στηριγμάτων, ◆ ανάπτυξη ταξιανθίας, ◆ έναρξη ανάπτυξης κώνων.

Αποθήκευση και μεταφορά:
Υγροσκοπικό προϊόν. Αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστή συσκευασία, σε ξηρό χώρο. Συλλέξτε το σε περίπτωση που χυθεί και ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Παραγωγός
Ημερομηνία λήξης/ αριθμός παρτίδας/ καθαρό βάρος: στη συσκευασία

Κίνδυνος

Σύμφωνα με ΕΚ 1272/2008
Περιέχει: τετραένυδρο οκταβορικό δινάτριο και θειικό ψευδάργυρο.

Προϊόν μόνο για επαγγελματική χρήση

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Έκθεση δια της στοματικής οδού.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πριν από τη χρήση διαβάστε τις ειδικές προφυλάξεις.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Χρησιμοποιείστε προστατευτικά γάντια, γυαλιά/προσωπίδα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Βγάλτε τους φακούς επαφής αν χρησιμοποιείτε και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε το ξέπλυμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Το περιεχόμενο/συσκευασία απορρίπτονται σε εξουσιοδοτημένο παραλήπτη αποβλήτων.